






Lésions élémentaires dans la maladie de Crohn ⁽¹⁾

Photo	N°	Lésion	Définition ou spécification
	1	Pseudopolype	—
	2	Ulcération cicatrisée	Zone blanchâtre avec aspect en « verre dépoli »
	3	Érythème franc (plaques, bandes ou diffus)	Un érythème léger ou modéré doit être négligé
	4	Muqueuse franchement œdématiée	Un œdème léger ou modéré de la muqueuse doit être négligé
	5	Ulcération aphtoïde	Petite lésion (2-3 mm) surélevée ou plane, blanche au centre
	6	Ulcération superficielle ou peu profonde	Toute ulcération ni aphtoïde ni profonde
	7	Ulcération profonde	Seules les ulcérations franchement profondes doivent être notées sous ce titre
	8	Sténose non ulcérée	Impossible ou difficile à traverser avec un endoscope pour adulte
	9	Sténose ulcérée	Impossible ou difficile à traverser avec un endoscope pour adulte

(1) Modigliani R, et al. Dig Dis Sci 1987;32:1370–9

Table de calcul du score CDEIS ⁽²⁾

	Ulcérations profondes 12 points	Ulcérations superficielles 6 points	Surface des lésions (0–10 cm*)	Surface des ulcérations (0–10 cm*)
Iléon	0 ou 12	0 ou 6	0–10	0–10
Côlon droit	0 ou 12	0 ou 6	0–10	0–10
Transverse	0 ou 12	0 ou 6	0–10	0–10
Côlon gauche	0 ou 12	0 ou 6	0–10	0–10
Rectum	0 ou 12	0 ou 6	0–10	0–10
Total				

* 0–10 cm sur une échelle visuelle analogique

Calcul

Total 1	Somme de toutes les cases du tableau	
Total 2	Total 1 ÷ nombre de segments explorés	(1 à 5)
+ 3	si sténose ulcérée	0 ou 3
+ 3	si sténose non ulcérée	0 ou 3
CDEIS	Total 2 + points de sténose	0 à 44

Valeurs de référence ⁽³⁾

- **Réponse endoscopique** : diminution du score de 50 %
- **Rémission endoscopique** : score < 3

(2) Mary JY, Modigliani R. Gut 1989;30:983–9

(3) Vuitton L, et al. Gut 2015