SFHGL
Société Française
d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
LA MINUTE HÉPATO
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

Seladelpar : normaliser les phosphatases alcalines dans la CBP

AASLD 2026 – Levy C et al. Abst. 5007

Survie en fonction des PAL



Murillo Perez CF, et al. Am J Gastroenterol. 2020

Essai de Phase III IDEAL

- CBP avec PAL comprise entre 1 et 1,67 fois la limite supérieure de la normale (LSN),
- malgré un traitement par AUDC (ou en cas d'intolérance à celui-ci).



<u>Critères d'évaluation principaux à M12 :</u>

- Combinaison PAL ≤ LSN et diminution ≥ 15 % par rapport à la valeur initiale
- Tolérance

Abs. 5007; Levy C et al. AASLD 2026

Essai de Phase III IDEAL

% de variation de PAL depuis le début du traitement



Critère de jugement principal (M12)

Combinaison PAL ≤ LSN et diminution ≥ 15 % par rapport à la valeur initiale à



Abs. 5007; Levy C et al. AASLD 2026

Essai de Phase III IDEAL

Bilirubine totale ≤ 0,6 limite supérieure de la normale à M12



Abs. 5007; Levy C et al. AASLD 2026