SFHGL
Société Française
d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
LA MINUTE HÉPATO
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

Bepirovirsen : enfin ça avance !

AASLD 2026 – Yuen MF et al. Abst. 0266

B-Well 1 & 2 : Design



Abs. 0266; Yuen MF et al. AASLD 2026

B-Well 1 & 2 : Résultats

SFHGL Société Française d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
La minute hépato
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

à S-72 (qAgHBs < 3000 UI)

19 % Cure fonctionnelle

30 % qHBsAg ≤ **100 IU/mL** sans cure fonctionnelle

À S-72 (qAgHBs < 1000 UI)

26 % Cure fonctionnelle

36 % qHBsAg ≤ **100 IU/mL** sans cure fonctionnelle



B-Well 1 & 2 : Résultats

SFHGL Société Française d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
La minute hépato
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

à S-72 (qAgHBs < 3000 UI)

19 % Cure fonctionnelle

30 % qHBsAg ≤ 100 IU/mL sans cure fonctionnelle

À S-72 (qAgHBs < 1000 UI)

26 % Cure fonctionnelle

36 % qHBsAg ≤ 100 IU/mL sans cure fonctionnelle

À S-96, soit 72 sem après arrêt du bepirovirsen (et 48 sem après arrêt de l'analogue NUC)

91 %

Cure fonctionnelle persistante

96 %

Charge virale (ADN) négative persistante

97 %

qAgHBs ≤ 100 UI/mL persistant

B-Well 1 & 2 : Tolérance

Effets indésirables rapportés chez >1% des patients

B-Well 1 & 2, n (%)	Bepirovirsen (n=291)
Infection respiratoire haute	12 (4)
Nasopharyngite	4 (3)
ALAT augmentée	3 (2)
Douleurs dorsales	3 (2)
Toux	3 (2)
Clair. creat abaissée (B-Well 2)	4 (3)

Effets secondaires attribués au traitement

Début durant sem 73-96, Grade 1 or 2 : 2 % (5/291)

- Dyspepsie
- Clairance de la créat abaissée
- Confusion
- Hypoesthésie

Effets secondaires sévères (sem 73 à 96)

B-Well 1 : 0

B-Well 2 : 4 % (5/136)

- Aucun attribué au traitement par investigateur et aucun fatal dee