SFHGL
Société Française
d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
LA MINUTE HÉPATO
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

Resmetirom : conseils pratiques

AASLD 2026 – Zhu A et al. Abst. 3483

Resmétirom ou sémaglutide ?

- Les deux traitements peuvent être proposés en première ligne chez les patients MASH non cirrhotiques F2–F3, mais leur choix doit être individualisé selon leur phénotype



Abs. 3483; Zhu A et al. AASLD 2026

Resmétirom en pratique

- Bilan pré-thérapeutique : bilan hépatique, TSH, T4L, créatinine, bilan lipidique
- Instauration : 80 ou 100 mg / jour selon le poids, en une prise
- Tolérance : diarrhées et nausées surtout les premières semaines, le plus souvent transitoires
- Interactions : vérifier statines, L-Thyroxine avant l'instauration
- Suivi : bilan hépatique à 3 mois puis tous les 6 mois, réévaluation de la fibrose à 12 mois

Abs. 3483; Zhu A et al. AASLD 2026

Resmétirom : quel suivi ?

	Initial	3 mois	6 mois	12 mois	> 12 mois
Prise en charge standard					
TNI (FibroScan…)	X			X	/ 12 mois
Bilan hépatique, INR, plaquettes	X	X	X	X	/ 6 mois
Poids, IMC	X	X	X	X	/ 6 mois
Evaluation nutritionnelle, activités physiques	X		X	X	/ 6 mois
Ajout spécifique					
Bilan lipidique	X		X	X	
Fonction thyroïdienne	X	*	*	*	/ 12 mois
Effets secondaires		X	X	X	/ 6 moisa

EASL-EASD-EASO guidelines updates, EASL 2026

Abs. 3483; Zhu A et al. AASLD 2026

Formalités administratives

SFHGL Société Française d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
La minute hépato
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

1



2



3



https://onlineservices.clinigengroup.com/

Abs. 3483; Zhu A et al. AASLD 2026