SFHGL
Société Française
d'Hépato-Gastroentérologie Libérale
LA MINUTE HÉPATO
L'AASLD et L'EASL en direct et en quelques minutes chaque jour

# Les transaminases normales cachent parfois la fibrose

*AASLD 2026 – Kotte M et al. Abst. 0208*

# Qui ?

| Caractéristique | Résultat |
|---|---|
| **Stéatose associée à un facteur de risque cardiométabolique** | 86 % |
| **Obésité** | 82 % |
| **Diabète** | 35 % |
| **IMC moyen** | 38,8 kg/m² |
| **Tour de taille moyen** | 124 cm |
| **ALAT moyenne** | 20,7 UI/L |

*Abs. 0208; Kotte M et al. AASLD 2026*

# Performance du FIB-4 pour le diagnostic de maladie silencieuse




*Abs. 0208; Kotte M et al. AASLD 2026*

# Fibrose significative avec transaminases normales




NNS : nombre de patients à dépister

| Données utilisées par l'Intelligence Artificielle<br>Valeurs SHAP (SHapley Additive exPlanations) | | |
|---|---|---|
| Tour de taille | CRP | HDL cholestérol |
| Âge | Créatinine | Seuil de pauvreté |
| IMC | TA systolique | Plaquettes |
| YGT | Cholestérol total | TA diastolique |
| HOMA-IR | Ph alcalines | Glycémie |

*Abs. 0208; Kotte M et al. AASLD 2026*